



**RELATÓRIO PARA USO DE
ANTIMICROBIANO DE ALTO
CUSTO**

Nome: _____

Data de nascimento: ____/____/____

PREENCHER NA AUSÊNCIA DE ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO

À operadora de saúde:

() USO PARA TRATAMENTO:

O paciente acima discriminado encontra-se internado na Clínica Santa Helena com o diagnóstico de:

- () pneumonia () infecção primária da corrente sanguínea () meningite () ventriculite
() infecção do trato urinário () infecção de ferida operatória () sepse de foco desconhecido
() diarreia bacteriana () endometrite () DIP – doença inflamatória pélvica
() outro foco: _____

Após tentativa prévia de outros antimicrobianos de menor espectro (conforme protocolos da instituição: PROT.SCIH.003 – SESPSE NEONATAL PRECOCE, PROT.SCIH.004 – SESPSE NEONATAL TARDIA e POP.SCIH.009 – ANTIBIOTICOTERAPIA EM INFECÇÃO PUERPERAL E ISC) não foi possível combater a infecção, sendo portanto, necessário e indicado o uso do seguinte antimicrobiano injetável, considerado como de alto custo, por _____ dias.

() **Koplan^R fr 400 mg – Teicoplanina:** cobertura para bactérias gram positivas, inclusive os resistentes a meticilina (oxacilina) e cefalosporinas (cefalexina, cefalotina), com a vantagem de menor lesão renal. Indicado também para diarreia por suspeita de colite pseudomembranosa, assim como listeria e micrococos;

() **Cipro^R inj. 400 mg/200 ML– Ciprofloxacino:** amplia espectro para bactérias gram negativas como Pseudomonas, assim como S. aureus, clamídias (infecções de órgãos reprodutores) e micobactérias;

() **Fluconazol 200 mg/100 ML** – tratamento de infecções fúngicas sistêmicas;

() **Meronen 500 mg – Meropenem** – amplia espectro para bactérias gram negativas e anaeróbios, efetivo contra Pseudomonas, com boa penetração no sistema nervoso central;

() **Tazocin fr 4,5 g – Piperacilina + Tazobactam:** eficaz como monoterapia para infecções polimicrobianas, com ótimo espectro para gram negativos e gram positivos, assim como anaeróbios, sendo ótima opção para infecção de órgãos reprodutores e neonatos com má resposta aos antibióticos habituais.

Informações adicionais (se necessário):

() USO PARA PROFILAXIA EM PREMATUROS:

O menor acima discriminado, prematuro, está internado na UTI neonatal, e, conforme protocolo da instituição (PROT.DT.012 – INDICAÇÃO DO USO DE FLUCONAZOL PROFILÁTICO EM PREMATUROS), está indicado o uso de **Fluconazol profilático (200 mg/200 ML injetável)**, por se tratar de prematuro menor de 1.000 g em uso de dispositivo invasivo (ventilação mecânica, PICC, NPT), visando prevenir infecções fúngicas.

Aracaju, ____ / ____ de 20 ____.

Médico da CCIH (ou médico assistente, na ausência do primeiro)